

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة البحر الأحمر

كلية الدراسات العليا

دراسة بعنوان :

فعالية التدخل الإرشادي في علاج التبول اللا إرادي

لدى حالات الأطفال المسجلة بمستشفى باوارث في مدينة بورتسودان

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التربية (تخصص علم نفس)

إشراف

إعداد الطالبة

د. صديق محمد محمد أبكر

تيسير عبدالمنعم محمد محمد زين

نوفمبر 2019م

المستخلص

هدفت الدراسة للتعرف على فعالية التدخل الإرشادي في علاج التبول اللا إرادي لدى حالات الأطفال المسجلة بمستشفى باوارث في مدينة بورتسودان اتبعت الدراسة المنهج التجريبي لملاءمته لها ، وتكون مجتمع الدراسة من 45 طفلاً وعينة الدراسة 11 مبحوث (7 ذكور و 4 إناث) كما استخدمت الدراسة برنامج تدريبي لقياس دور البرنامج.

توصلت الدراسة للنتائج التالية :

- 1- عدم وجود فروق في عدد مرات التبول اللاإرادي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي.
 - 2- وجود فروق في عدد مرات التبول اللاإرادي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي.
 - 3- عدم وجود فروق في عدد مرات التبول اللاإرادي بين المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي.
 - 4- عدم وجود فروق في المجموعة التجريبية بين الذكور وبين الإناث في القياس البعدي في عدد مرات التبول اللاإرادي.
 - 5- وجود فروق في المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لصالح البعدي.
- وأوصت الدراسة بالآتي :

1. ضرورة التصدي بفعالية لعلاج التبول اللا إرادي من خلال التدخل الإرشادي في جميع حالات الأطفال المسجلة بمستشفى باوارث في مدينة بورتسودان

Abstract

The study was designed to identify the effectiveness of guided intervention in treating involuntary urination among registered cases of children admission to Bawarith hospital in PortSudan.

The study followed the experimental method whereas the research community consists of 45 children and simple sample of 11 study (7 males and 4 females) The study also used a training program to measure the role of the program

The study found the following results:

1. There were no differences in the number of urination between the experimental group and the control group in the tribal measurement.
2. There are differences in the number of involuntary urination between the experimental group and the control group in the telemetry.
3. There are no differences in the number of involuntary urination between the experimental group in the telemetry and the sequential measurement.
4. There are no differences in the experimental group between males and females in post-measurement in the number of involuntary urination.
5. There are differences in the experimental group in the tribal and remote measurement in favor of the dimension.

The study recommended the following:

The necessity to effectively encounter the therapy of involuntary urination via guided intervention in all registered cases of children who admission to Bawarith hospital in PortSudan city.

فهرست الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
الاستهلال	أ
الاهداء	ب
الشكر والعرفان	ت
المستخلص باللغة العربية	ث
المستخلص باللغة الانجليزية	ج
فهرس الموضوعات	ح
الجداول	خ
الملاحق	د
الفصل الأول (الإطار العام للدراسة)	
المقدمة	1
مشكلة الدراسة	2-1
فرضيات الدراسة	2
أهداف الدراسة	2
أهمية الدراسة	3-2
منهج الدراسة	3
حدود الدراسة	3
مصطلحات الدراسة	5-3
الفصل الثاني (الإطار النظري والدراسات السابقة)	
المبحث الأول: التبولوج اللا إرادي	21 - 6
المبحث الثاني: التدخل الارشادي	29 - 22
المبحث الثالث: التعليم والتدريب	34 - 30
المبحث الرابع : الدراسات السابقة	41 - 35

الفصل الثالث اجراءات الدراسة الميدانية	
42	تمهيد
42	مجتمع الدراسة
42	مجتمع الدراسة
43	عينة الدراسة
50 - 43	أدوات الدراسة
	أساليب المعالجة الإحصائية
الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها	
51	تمهيد
61 - 51	عرض نتائج
65 - 61	مناقشة النتائج
الفصل الخامس : النتائج والتوصيات والمقترحات	
66	النتائج
66	التوصيات
67	المقترحات
70 - 68	المصادر والمراجع
71	الملاحق

أولاً: النتائج:

لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. عدم وجود فروق في عدد مرات التبول اللاارادى بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي.
2. وجود فروق في عدد مرات التبول اللاارادى بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي.
3. عدم وجود فروق في عدد مرات التبول اللاارادى بين المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي.
4. عدم وجود فروق في المجموعة التجريبية بين الذكور وبين الإناث في القياس البعدي في عدد مرات التبول اللاارادى.
5. وجود فروق في المجموعة التجريبية في القياس القبلي و البعدي لصالح البعدي.

ثانياً: التوصيات:

استناداً إلى ما توصلت إليه الباحثة إلى نتائج الدراسة توصى الباحثة بما يلي:

1. الاهتمام بقضايا الطفولة وخاصة المشاكل التي يمكن أن تعالج منذ الصغر وإذا لم تلقى الاهتمام يمكن أن تتسبب في زعزعت الثقة في نفسية الطفل أمام أقرانه.
2. عدم الاعتماد على نظرية واحدة أو منهج واحد في التدخل الإرشادي.
3. استخدام فنيات ومهارات الإرشاد الديني في التدخل الإرشادي.
4. تأهيل وتدريب الأخصائيين والمرشدين والمعالجين والعاملين في مجال الإرشاد النفسي على اكتساب المهارات اللازمة التي تتعلق بالتدخل الإرشادي لعلاج حالات التبول اللاإرادي، والعمل على تعميمها عبر الكتب والنشرات لتطبيقها عيادياً.
5. تبني المؤسسات الرسمية والأهلية للباحثين وتشجيعهم لعمل أبحاث ودراسات على مدى فعالية الإرشاد الانتقائي التكاملي في مختلف الاضطرابات النفسية وتعميم نتائج هذه الأبحاث.
6. العمل على المزيد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتدخل الإرشادي الانتقائي التكاملي.
7. ضرورة الأخذ بالأساليب المستحدثة بعلاج التبول اللاارادي دون عقاقير كما يمكن أن يساعد هذا البحث في الكثير من حالات التبول اللاارادي دون تدخل دوائي أو عقاقير.

